

## Крива затока та Крива коса

### Імена та адреси укладачів інформаційного листа рамсарського ВБУ:

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, E-mail: [parks@parks.freenet.kiev.ua](mailto:parks@parks.freenet.kiev.ua);

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e-mail: [kv@wetl.kiev.ua](mailto:kv@wetl.kiev.ua).

**Дата підготовки опису:** 1 грудня 2003 р.

**Географічні координати:** 47°03' пн. ш., 38°07' сх. д.

**Розташування:** Північне Приазов'я, Новоазовський район Донецької області, на південний захід від м. Новоазовськ.

**Висота над рівнем моря:** мінімальна – 0,2 м, максимальна – 1,6 м

**Площа:** 1400 га

**Короткий опис:** Угіддя складається з морської затоки, піщано-черепашкової коси та системи мілководних озер з очеретяними заростями. Має дуже велике значення як місце гніздування та утворення сезонних скупчень водолюбних птахів.

**Рамсарські критерії:** 3, 4

### Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(3) Тут регулярно перебуває велика кількість голінастих *Ciconiiformes*, сивкоподібних *Charadriiformes* та гусеподібних *Anseriformes* птахів, які є індикаторами екологічного стану середовища.

(4) Місце гніздування 10–15 тис. пар водно-болотних птахів та зимівлі кількох тисяч гусеподібних.

**Фізичні особливості ВБУ:** Подекуди по берегах Кривої затоки спостерігаються виходи вапняків. Західний берег коси досить порізаний, тут багато невеликих заток та прибережних мілководних озер, мулистих наливних островів. На косі знаходяться піщано-черепашкові пляжі, солончакові та літоральні болота, низькотравні ділянки. Внаслідок алювіальних процесів розміри коси постійно збільшуються. У західній прибережній частині Кривої коси багато заток та мілководних озер. До угіддя також належить лиман Кривокосий з прилеглими до нього мілководдями та заплавою річки Мокра. Угіддя постійно видозмінюється завдяки впливу осінніх та весняних штормів, що може спричинити утворення нових солоних озер. Клімат помірно-континентальний з короткою теплою зимою і довгим спекотним літом. Річна кількість опадів становить 300–400 мм, а випаровування – 800–900 мм. Температура води влітку – +22–30 °С, взимку – близько 0°С. Солоність води в затоці близько 13‰. Гідрорежим Кривої затоки визначається, головним чином, Азовським морем. Вплив на нього мілководної річки Грузький Єланчик та кількох інших невеликих пересихаючих влітку річок майже не виявляється.

**Фізичні особливості водозбірної території:** Крива затока є невеликою затокою Азовського моря. Її північний берег материковий, а східний утворений Кривою косою, довжина якої становить 10 км. Угіддя постійно видозмінюється внаслідок впливу осінніх та весняних штормів, що може спричинити утворення нових солоних озер.

**Гідрологічна цінність:** Угіддя відзначається багатою фауною гідробіонтів.

**Тип ВБУ:** А, Е

**Екологічні особливості:** Основними біотопами угіддя є заболочені і дюнні луки, угруповання відкритої води та галофітні ценози з переважанням видів: куширу темно-зеленого *Ceratophyllum demersum*, рдеснику гребінчастого *Potamogeton pectinatus*, різухи морської *Najas marina*, очерету звичайного *Phragmites australis*, куги озерної *Schoenoplectus lacustris* і Табернемонтана *S. tabernaemontani*, рогозу Лаксмана *Typha laxmannii*, осоки колхідської *Carex colchica*, куничнику наземного *Calamagrostis epigeios*, галіміони черешкуватої *Halimione pedunculata* і бородавчастої *H. verrucifera*, кермеку Мейера *Limonium meyeri*, подорожнику Корнута *Plantago cornuti*, покісниці розставленої *Puccinellia distans*, аргузії сибірської *Argusia sibirica*, полину сантонінського *Artemisia santonica*, катрану понтійського *Crambe pontica*, миколайчиків приморських *Eryngium maritimum*, солодки щетинистої *Glycyrrhiza echinata* і голої *G. glabra*, лещиці пронизанолистої *Gypsophila*

paniculata, колосняку чорноморського *Leymus sabulosus* та камки морської *Zostera marina*. На мілководдях та прибережних ділянках затоки найпоширенішою є повітряно-водна (утворена очеретом звичайним *Phragmites australis*, кугою Табернемонтана *Schoenoplectus tabernaemontani*, бульбокомишом морським *Bolboschoenus maritimus* й іншими видами) та водна (утворена рупією морською *Ruppia maritima*, камкою морською *Zostera marina* й іншими видами) рослинність.

**Цінна флора:** На підвищених ділянках уздовж узбережжя зростають види з Червоної книги України: тамарикс стрункий *Tamarix gracilis*, астрагал дніпровський *Astragalus borysthenicus* (ендемик), карагана скіфська *Caragana scythica* (ендемик), морковниця прибережна *Astrodaucus littoralis* (ендемик), пирій ковилолистий *Elytrigia stipifolia*, ковила волосиста *Stipa capillata*, ковили найкрасивіша *S. grafiiana* і Лессінга *S. lessingiana*, а також рідкісна лікарська рослина – солодка гола *Glycyrrhiza glabra*.

#### **Цінна фауна:**

**Ссавці:** нориця звичайна *Microtus arvalis* та лисиця звичайна *Vulpes vulpes*.

**Птахи.** В межах угіддя зареєстровано 254 види птахів, з них гніздяться 32 види. Основу орнітофауни складають представники водно-болотного комплексу. Загальна кількість птахів, що тут гніздяться, становить 10,5–15 тис. пар. Найчастіше та у найбільшій кількості представлені мартин жовтоногий *Larus cachinnans* (5 тис. пар), реготун чорноголовий *L. ichthyaethus* (1200 пар), мартин звичайний *L. ridibundus* (100–250 пар), крячок рябодзьобий *Sterna sandvicensis* (3–4 тис. пар), малий *S. albifrons* (250–400 пар) і річковий *S. hirundo* (2,5–3,5 тис. пар). Основними місцями гніздування є зарості вищої водної рослинності, піщані та черепашкові береги, солончаки, солончакові болота. З червонокнижних видів гніздяться морський зуйок *Charadrius alexandrinus* (25–50 пар), дерихвіст лучний *Glareola pratincola* (25–70 пар). Слід також вказати чаплю велику білу *Egretta alba* (50–70 пар). У сезонних скупченнях налічується до 25–30 тис. особин, зокрема взимку тут збираються кілька тисяч гусей роду *Anser* – переважно на затоці, лимані та озерах. У міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені крячок білокрилий *Chlidonias leucopterus* (1 тис. ос.), крячок чорний *Chlidonias niger* (2,5 тис. ос.), чапля велика біла *Egretta alba* (260 ос.), мартин малий *L. minutus* (5–7 тис. ос.), мартин звичайний *L. ridibundus* (5–10 тис. ос.), крячок річковий *Sterna hirundo* (5 тис. ос.).

**Риби:** Тут мешкають реліктові види риб – білуга чорноморська *Huso huso ponticus* (Червона книга України) та севрюга *Acipenser stellatus*, яка є об'єктом промислового лову.

**Соціальні та культурні цінності:** Угіддя має велике значення для екологічної просвіти, рекреації та наукових досліджень; це традиційне місце рибальства для місцевих жителів.

**Землеволодіння:** ВБУ: державна та колективна форма власності. Прилеглі землі: державна, колективна, приватна форми власності.

**Поточне землекористування:** ВБУ: впроваджується, але обмежується і контролюється експлуатація природних ресурсів (рибництво, рибальство, полювання, рекреація тощо). Прилеглі землі: здійснюються всі перелічені вище форми природокористування, а також традиційне фермерство (випасання худоби, виноградарство, іригація тощо).

**Чинники (минулі, сучасні або потенційні), несприятливі для угіддя, в т. ч. зміни у природокористуванні або проекти розвитку:** Угіддю загрожують стічні сільськогосподарські та промислові води, підвищення рекреаційного тиску, надмірне випасання худоби та випалювання очерету. Крім того, місцеві жителі збирають яйця та пташенят водоплавних птахів, а також полюють на дорослих особин. Із розширенням економічної діяльності та рекреації, територія природних біотопів угіддя зменшуватиметься.

**Вжиті природоохоронні заходи:** Угіддя включає дві природоохоронні території – орнітологічний заказник «Кривокоський лиман» та пам'ятку природи державного значення «Крива Коса».

**Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи:** Відведення території всього угіддя під природний заповідник.

**Проведені наукові дослідження:** Наукові дослідження проводять співробітники Інституту зоології НАН України, Мелітопольського педагогічного університету та Донецького державного університету.

**Сучасний стан екологічної освіти, просвіти, інформування та виховання:** Поінформованість та освіта у сфері збереження довкілля забезпечується загальноосвітніми школами. Крім того, спеціалісти університетів та інших організацій читають лекції для основних зацікавлених груп населення.

**Сучасний стан рекреації та туризму:** У межах угіддя практикується неорганізований туризм.

**Юрисдикція:** За охорону і збереження угіддя відповідають землевласники, землекористувачі та місцеві органи влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління екобезпеки в Донецькій області.

**Орган управління ВБУ:** Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області. Адреса: пр. Миру, 2б, м. Донецьк, 83050; тел: (0622) 340 0006, e-mail: postmaster@ecology.donetsk.ua

**Джерела інформації:**

- 1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клестов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська О. Л. Водно-болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. – Київ, 1999.
- 2) Directory of Azov-Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy Marushevsky. – Kyiv: Wetlands International, 2003. – 235 pp., 81 maps.